



per Gatti e Furetti

Indicazioni nei Gatti

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.
- Eliminazione delle pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovocida), larve e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci adulte per sei settimane dopo l'applicazione.
- Eliminazione delle zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'efficacia acaricida persistente fino a 2 settimane contro le zecche (sulla base di dati sperimentali).
- Eliminazione dei pidocchi (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci (FAD), dove questo è stato precedentemente diagnosticato da un veterinario.

Indicazioni nei Furetti

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da solo o in associazione con le zecche.
- Eliminazione delle pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 4 settimane.
- Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovocida), larve e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci adulte.
- Eliminazione delle zecche (*Ixodes ricinus*). Il prodotto ha un'efficacia acaricida persistente per 4 settimane contro le zecche (sulla base di dati sperimentali).

Nome prodotto	Specie	Posologia	Confezione
FIPREX DUO 50 mg + 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti Fipronil/ (S)-methoprene	gatto	Una pipetta da 0,5 ml per un gatto, corrispondente a una dose minima raccomandata di 5 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 0,5 ml
	furetto	Una pipetta da 0,5 ml per furetto corrispondente a una dose di 50 mg per fipronil e 60 mg per (S)-methoprene per furetto, mediante applicazione topica sulla pelle. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	



Informazioni su FIPREX DUO

Come si utilizza

Tenere la pipetta in posizione verticale e picchiettarne la parte stretta per assicurarsi che il contenuto si raccolga sul fondo. Aprire tirando indietro la punta. Applicare direttamente sulla pelle tra le scapole avendo cura di separare i peli sul dorso dell'animale. Spremere la pipetta più volte per svuotare completamente e direttamente il contenuto sulla pelle in un unico punto.

FIPREX DUO è un medicinale veterinario senza obbligo di prescrizione. Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la bocca, la pelle e gli occhi.

Non usare su animali malati (ad es. malattie sistemiche, febbre) o convalescenti. Non usare nei conigli, poiché possono verificarsi reazioni avverse inclusa la morte. Non usare dopo la data di scadenza che è riportata sul cartone e sulla pipetta dopo la voce "Scad."

Per ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Chiedi al tuo medico Veterinario. Disponibile nei pet shop, nelle farmacie e nei negozi specializzati.

Per maggiori informazioni, consulta il foglietto illustrativo o collegati al sito deltatic.it/multiprotezione.

INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A.
con unico socio (a LIVISTO company)
Viale Corassori, 62, 41124 Modena
T +39 0522 640711 | F +39 0522649757
info@deltatic.it



FIPREX[®] DUO

Antiparassitario Spot-on per cani, gatti e furetti.



**PROTEZIONE AMBIENTALE
ATTIVA E INVISIBILE CONTRO PULCI,
PIDOCCHI E ZECCHE.**

**Effetto rapido grazie all'azione combinata
di due principi attivi.**

FIPREX DUO Spot-on è una soluzione insetticida e acaricida in forma spot-on per CANI, GATTI E FURETTI. Grazie alla combinazione dei suoi due principi attivi, Fipronil e (S)-methoprene, è attivo su zecche, pidocchi, pulci adulte ma anche uova e larve di pulci per impedire la comparsa di nuovi parassiti.

Il **Fipronil** agisce su particolari recettori presenti esclusivamente negli invertebrati, provocandone un'attività incontrollata del sistema nervoso centrale determinando, dal momento dell'infestazione, la **morte delle pulci entro 24 ore** e quella di **zecche e pidocchi entro 48 ore**. **(S)-methoprene** è un regolatore di crescita degli insetti.

Indicazioni nei Cani

- Da utilizzare contro le infestazioni da pulci, da sole o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.
- Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione della moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo di uova (attività ovidica) e larve e pupe (attività larvicida) originate da uova deposte da pulci adulte per otto settimane dopo l'applicazione.
- Trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'efficacia acaricida persistente fino a 4 settimane contro le zecche.
- Trattamento delle infestazioni da pidocchi (*Trichodectes canis*).
- Il prodotto può essere usato anche durante la gravidanza e l'allattamento.

Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite allergica da pulci (FAD), dove questo è stato precedentemente diagnosticato da un veterinario.

**FIPREX[®] per Cani
DUO**



Da 2 a 10 kg

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
S	FIPREX DUO S 67 mg + 60,3 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 0,67 ml per un cane di peso superiore a 2 e fino a 10 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 0,67 ml

Aut. Min. AIC n. 105314025



Da 20 a 40 Kg

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
L	FIPREX DUO L 268 mg + 241,2 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 2,68 ml per un cane di peso superiore a 20 e fino a 40 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente un blister da 1 pipetta da 2,68 ml

Aut. Min. AIC n. 105314064



Da 10 a 20 Kg

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
M	FIPREX DUO M 134 mg + 120,6 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 1,34 ml per un cane di peso superiore a 10 e fino a 20 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente in un blister 1 pipetta da 1,34 ml

Aut. Min. AIC n. 105314049



Oltre i 40 Kg

Taglia	Nome prodotto	Posologia	Confezione
XL	FIPREX DUO XL 402 mg + 361,8 mg soluzione spot-on per cani Fipronil/(S)-methoprene	Una pipetta di 4,02 ml per un cane di peso superiore a 40 kg, corrispondente a una dose minima raccomandata di 6,7 mg/kg per fipronil e 6 mg/kg per (S)-methoprene, mediante applicazione topica cutanea. L'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 4,02 ml

Aut. Min. AIC n. 105314088

